レジメン名 ALL202-O Ph(-) consolidation C1(60以上)
コメント **ALL**
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃｶﾄﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 240 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント DEXA 33mg/body@ALL202-O Ph(-) consoridation C1	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃｶﾄﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 240 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント DEXA 33mg/body@ALL202-O Ph(-) consoridation C1	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃｶﾄﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 240 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント DEXA 33mg/body@ALL202-O Ph(-) consoridation C1																									
		【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP-16 100mg/㎡@ALL202-O Ph(-) consoridation C1	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP-16 100mg/㎡@ALL202-O Ph(-) consoridation C1	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP-16 100mg/㎡@ALL202-O Ph(-) consoridation C1																									
		【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 1000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント AraC 1000mg/㎡@ALL202-O Ph(-) consoridation C1 ※あらかじめ100mL抜いてから調製する【AraC 1回目】	【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 1000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント AraC 1000mg/㎡@ALL202-O Ph(-) consoridation C1 ※あらかじめ100mL抜いてから調製する【AraC 1回目】	【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 1000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント AraC 1000mg/㎡@ALL202-O Ph(-) consoridation C1 ※あらかじめ100mL抜いてから調製する【AraC 1回目】																									
		【滴下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 1000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント AraC 1000mg/㎡@ALL202-O Ph(-) consoridation C1 ※あらかじめ100mL抜いてから調製する【AraC 2回目】	【滴下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 1000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント AraC 1000mg/㎡@ALL202-O Ph(-) consoridation C1 ※あらかじめ100mL抜いてから調製する【AraC 2回目】	【滴下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 1000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント AraC 1000mg/㎡@ALL202-O Ph(-) consoridation C1 ※あらかじめ100mL抜いてから調製する【AraC 2回目】																									
		【滴下順:0】 手技 脳脊髄腔注射 (腰椎) 薬品 メソトレキセート注(MTX) 15 mg デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃｶﾄﾛﾝ) 2 A 生理食塩液 20mL 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 1260 ml/h 速度指示(時間) 注入時間1分 注射フリーコメント MTX 15mg/b+DEXA 3.3mg/b i.t.@ALL202-O Ph(-) conso 全量が5mLになるように調製する																										
治療	抗がん剤処方	フルメトロン点眼液0. 1%5mL 1 本 点眼 1日4回両目に点眼 キロサイド投与前日から終了翌日まで点眼																										