レジメン名 Hyper CVAD q3w
コメント **ALL**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 440 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 440 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 440 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 440 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分							【適下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 440 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 440 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 440 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 440 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分							
		【適下順：2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分																	
		【適下順：3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エンドキサン注(CPA) 300 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間3時間 注射フリーコメント CPA 300mg/㎡ ×2回　12h毎※Hyper CVAD	【適下順：3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エンドキサン注(CPA) 300 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間3時間 注射フリーコメント CPA 300mg/㎡ ×2回　12h毎※Hyper CVAD	【適下順：3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エンドキサン注(CPA) 300 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間3時間 注射フリーコメント CPA 300mg/㎡ ×2回　12h毎※Hyper CVAD																	
		【適下順：4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【適下順：4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【適下順：4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス																	
					【適下順：3】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 オンコビン注(VCR) 2 mg 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント VCR 2mg/body※Hyper CVAD療法 生食はVCRの投与量に合わせ0.1mg/mLで調製 投与前日よりイトリゾールを3日間休薬						【適下順：2】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 オンコビン注(VCR) 2 mg 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント VCR 2mg/body※Hyper CVAD療法 生食はVCRの投与量に合わせ0.1mg/mLで調製 投与前日よりイトリゾールを3日間休薬							
		【適下順：5】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント 2回目のCPA直前に投与	【適下順：5】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント 2回目のCPA直前に投与	【適下順：5】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント 2回目のCPA直前に投与																	
		【適下順：6】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エンドキサン注(CPA) 300 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間3時間 注射フリーコメント CPA 300mg/㎡ ×2回　12h毎※Hyper CVAD	【適下順：6】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エンドキサン注(CPA) 300 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間3時間 注射フリーコメント CPA 300mg/㎡ ×2回　12h毎※Hyper CVAD	【適下順：6】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エンドキサン注(CPA) 300 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間3時間 注射フリーコメント CPA 300mg/㎡ ×2回　12h毎※Hyper CVAD																	
		【適下順：7】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【適下順：7】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【適下順：7】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス																	
		【適下順：0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 600 mg/㎡ 生理食塩液　500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 20.833 ml/h 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント 別ルート投与	【適下順：0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 600 mg/㎡ 生理食塩液　500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 20.833 ml/h 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント 別ルート投与	【適下順：0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 600 mg/㎡ 生理食塩液　500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 20.833 ml/h 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント 別ルート投与																	
					【適下順：4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ドキソルビシン注(DXR・ADR) 50 mg/㎡ 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント DXR 50mg/㎡ div 24hr※HyperCVAD															
					【適下順：5】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント 夕方以降に投与															
						【適下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント DXR使リンス														
治療	抗がん剤処方				般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回　DXR投与1～1.5時間 1 日分																
						般)アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分															