レジメン名 MA q3w
コメント **ALL**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
			【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン1番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン1番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン1番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン1番目】															
					【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 注射フリーコメント ※day4はAraC後からAM8時まで 【メイン2番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 注射フリーコメント ※day4はAraC後からAM8時まで 【メイン2番目】															
			【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン2番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン2番目】															
			【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管1番目】AM6:00	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管1番目】AM6:00	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管1番目】AM6:00	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管1番目】AM6:00															
		【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)② 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【別ルート1番目】MTXの直前に投与																		
		【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)② 薬品 メソトレキセート注(MTX) 200 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント MTX 200mg/㎡、最初の2時間で点滴＠MA療法 【別ルート2番目】 ※パクタは72時間前より休薬する																		
		【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 メソトレキセート注(MTX) 800 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間22時間 注射フリーコメント MTX 800mg/㎡、残り22時間で点滴＠MA療法 【別ルート3番目】 ※パクタは72時間前より休薬する																		
			【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)② 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【別ルート-1番目 AraC前に投与】	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)② 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【別ルート-1番目 AraC前に投与】															
			【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡ ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント AraC 2000mg/㎡×2回(12時間毎)＠MA療法 60歳以上は1000mg/㎡へ減量する(50%減) 予め100mL抜いてから調製する 【別ルート2番目 AraC 1回目】	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡ ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント AraC 2000mg/㎡×2回(12時間毎)＠MA療法 60歳以上は1000mg/㎡へ減量する(50%減) 予め100mL抜いてから調製する 【別ルート2番目 AraC 1回目】															
			【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)② 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 1回目のAraC後リンス	【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)② 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 1回目のAraC後リンス															
【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン初日1番目、day2以降3番目】		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン初日1番目、day2以降3番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン初日1番目、day2以降3番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン初日1番目、day2以降3番目】															
					【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン4番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン4番目】															

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
注射	注射	【滴下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【メインの側管から】夕方以降に投与。																				
			【滴下順:4】 手技 中心静脈(S)② 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【別ルート AraC 2回目の前】	【滴下順:4】 手技 中心静脈(S)② 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【別ルート AraC 2回目の前】																	
			【滴下順:5】 手技 中心静脈(S)② 薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント AraC 2000mg/㎡×2回(12時間毎)@MA療法 60歳以上は1000mg/㎡へ減量する(50%減) 予め100mL抜いてから調製する 【別ルート AraC 2回目】	【滴下順:5】 手技 中心静脈(S)② 薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント AraC 2000mg/㎡×2回(12時間毎)@MA療法 60歳以上は1000mg/㎡へ減量する(50%減) 予め100mL抜いてから調製する 【別ルート AraC 2回目】																	
			【滴下順:6】 手技 中心静脈(S)② 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【別ルート 2回目のAraC後リンス】	【滴下順:6】 手技 中心静脈(S)② 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【別ルート 2回目のAraC後リンス】																	
					【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 注射フリーコメント【メイン5本目】																	
					【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン6本目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン6本目】																	
				【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与	【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与	【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与																	
				【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与	【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与	【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与																	
				【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与	【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与	【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与																	
			【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与	【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与	【滴下順:0】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 ロイコボリン筋注3mg 5 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 60 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント MTX投与開始後36時間後～6時間毎に13回投与																	
【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管2番目】PM18:00		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管2番目】PM18:00	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管2番目】PM18:00	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管2番目】PM18:00	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管2番目】PM18:00	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管2番目】PM18:00																	
【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン day1は2番目、day2-3は4番目】		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン day1は2番目、day2-3は4番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾂﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 86.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間6時間 注射フリーコメント【メイン day1は2番目、day2-3は4番目】																	
		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL未満で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL未満で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL未満で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL未満で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL未満で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与																	
【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL以下で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL以下で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL以下で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL以下で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL以下で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与																	

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
			【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL以下で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL以下で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL以下で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 0.5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 尿量スケール12時間尿1200mL以下で投与 体重スケール BW>base line+1.5kgで投与																	
			【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与	【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与	【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与	【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与	【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与																	
		【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与	【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与	【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与																	
		【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与	【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与	【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与	【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与	【滴下順:0】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 メイロン静注8. 4%　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 840 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【頓用】尿pHが7以下で追加投与																	
治療	処方	フルメトロン点眼液0. 1%5mL 1 本 点眼　1日4回両目に点眼 キロサイド投与前日～終了翌日まで点眼																				