レジメン名 AML 201 induction A IA 3+7 q3w
コメント **AML**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 208 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分																			
			【滴下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 208 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【滴下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 208 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分															
		【滴下順：2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 イダマイシン注(IDR) 12 mg/㎡ 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 100mL 100 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IDAR 12mg/㎡※IDA+AraC療法（induction）	【滴下順：2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 イダマイシン注(IDR) 12 mg/㎡ 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 100mL 100 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IDAR 12mg/㎡※IDA+AraC療法（induction）	【滴下順：2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 イダマイシン注(IDR) 12 mg/㎡ 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 100mL 100 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IDAR 12mg/㎡※IDA+AraC療法（induction）															
		【滴下順：4】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 100mg/㎡※IDA+AraC（induction）	【滴下順：0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 100mg/㎡※IDA+AraC（induction）	【滴下順：0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 100mg/㎡※IDA+AraC（induction）	【滴下順：0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 100mg/㎡※IDA+AraC（induction）	【滴下順：0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 100mg/㎡※IDA+AraC（induction）	【滴下順：0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 100mg/㎡※IDA+AraC（induction）											
		【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス用					【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス用									
治療	抗がん剤処方	錠）アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																			
			錠）アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																		