レジメン名 AML 201 consolidation C HDAC 2000 q3w
コメント **AML**
標準適用日数 21日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 | 15病日 | 16病日 | 17病日 | 18病日 | 19病日 | 20病日 | 21病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【滴下順:1】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:1】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:1】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:1】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:1】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:2】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間3時間<br>注射フリーコメント HDAC療法<br>AraC 2000mg/㎡ ×2回/day 12時間毎に<br>あらかじめ100mL抜いてから調製する。 | 【滴下順:2】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間3時間<br>注射フリーコメント HDAC療法<br>AraC 2000mg/㎡ ×2回/day 12時間毎に<br>あらかじめ100mL抜いてから調製する。 | 【滴下順:2】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間3時間<br>注射フリーコメント HDAC療法<br>AraC 2000mg/㎡ ×2回/day 12時間毎に<br>あらかじめ100mL抜いてから調製する。 | 【滴下順:2】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間3時間<br>注射フリーコメント HDAC療法<br>AraC 2000mg/㎡ ×2回/day 12時間毎に<br>あらかじめ100mL抜いてから調製する。 | 【滴下順:2】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間3時間<br>注射フリーコメント HDAC療法<br>AraC 2000mg/㎡ ×2回/day 12時間毎に<br>あらかじめ100mL抜いてから調製する。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:3】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | 【滴下順:3】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | 【滴下順:3】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | 【滴下順:3】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | 【滴下順:3】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:4】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:4】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:4】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:4】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:4】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:5】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間3時間<br>注射フリーコメント HDAC療法<br>AraC 2000mg/㎡ ×2回/day 12時間毎に<br>あらかじめ100mL抜いてから調製する。 | 【滴下順:5】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間3時間<br>注射フリーコメント HDAC療法<br>AraC 2000mg/㎡ ×2回/day 12時間毎に<br>あらかじめ100mL抜いてから調製する。 | 【滴下順:5】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間3時間<br>注射フリーコメント HDAC療法<br>AraC 2000mg/㎡ ×2回/day 12時間毎に<br>あらかじめ100mL抜いてから調製する。 | 【滴下順:5】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間3時間<br>注射フリーコメント HDAC療法<br>AraC 2000mg/㎡ ×2回/day 12時間毎に<br>あらかじめ100mL抜いてから調製する。 | 【滴下順:5】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間3時間<br>注射フリーコメント HDAC療法<br>AraC 2000mg/㎡ ×2回/day 12時間毎に<br>あらかじめ100mL抜いてから調製する。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:6】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | 【滴下順:6】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | 【滴下順:6】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | 【滴下順:6】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | 【滴下順:6】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | | | | | | | | | | | | | |
| 治療 | 抗がん剤処方 | フルメトロン点眼液0．1%5mL 1 本<br>点眼 1日4回両目に点眼<br>day1-6まで点眼する。できれば前日から開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |