レジメン名 AML 201 consolidation D2 DA q3w
コメント **AML**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																			
			【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分														
		【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ダウノマイシン注(DNR) 50 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント DNR 50mg/㎡@AML201 (consolidation)	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ダウノマイシン注(DNR) 50 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント DNR 50mg/㎡@AML201 (consolidation)	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ダウノマイシン注(DNR) 50 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント DNR 50mg/㎡@AML201 (consolidation)															
		【滴下順:4】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 200mg/㎡@DNR+AraC (consolidation)	【滴下順:0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 200mg/㎡@DNR+AraC (consolidation)	【滴下順:0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 200mg/㎡@DNR+AraC (consolidation)	【滴下順:0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 200mg/㎡@DNR+AraC (consolidation)	【滴下順:0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 200mg/㎡@DNR+AraC (consolidation)															
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用			【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用													
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																			
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																		