レジメン名 AML 201 consolidation D4 A-tripleV q3w
コメント **AML**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
			【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分														
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 250 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 100mg/㎡ day1-5@A-triple V療法 DEHPフリーのルートで投与 ※1時間で投与するため希釈液250mlを使用	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 250 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 100mg/㎡ day1-5@A-triple V療法 DEHPフリーのルートで投与 ※1時間で投与するため希釈液250mlを使用	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 250 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 100mg/㎡ day1-5@A-triple V療法 DEHPフリーのルートで投与 ※1時間で投与するため希釈液250mlを使用	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 250 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 100mg/㎡ day1-5@A-triple V療法 DEHPフリーのルートで投与 ※1時間で投与するため希釈液250mlを使用	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 250 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 100mg/㎡ day1-5@A-triple V療法 DEHPフリーのルートで投与 ※1時間で投与するため希釈液250mlを使用														
		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント AraCのプライミング用																				
		【滴下順:4】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 200mg/㎡@A-tripleV(consolidation)	【滴下順:0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 200mg/㎡@A-tripleV(consolidation)	【滴下順:0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 200mg/㎡@A-tripleV(consolidation)	【滴下順:0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 200mg/㎡@A-tripleV(consolidation)	【滴下順:0】 手技 中心静脈(D)①-(白) 薬品 キロサイド注(Ara-C) 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 200mg/㎡@A-tripleV(consolidation)														
		【滴下順:3】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【滴下順:3】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【滴下順:3】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【滴下順:3】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【滴下順:3】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【滴下順:3】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス														
									【滴下順:1】 手技 ワンショット静脈注射 薬品 オンコビン注(VCR) 0.8 mg/㎡ 生理食塩液 20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント VCR 0.8mg/㎡ day8@A-triple V療法 生食はVCRの投与量に合わせ0.1mg/mLで調製													
											【滴下順:1】 手技 ワンショット静脈注射 薬品 フィルデシン注(VDS) 2 mg/㎡ 生理食塩液 20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント VDS 2mg/㎡ day10@A-triple V療法 生食はVDSの投与量に合わせ1mg/mLで調製											
									【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス		【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス											