レジメン名 BA q4w
コメント **AML**
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日
休薬完了	休薬完了							
注射		【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する
		【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分

日付		8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了							
注射		【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アクラシノン注(ACR) 20 mg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント ACR 20mg/body/㎡BA療法
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サンラビン注(BH-AC) 200 mg 注射用水 20mL 1 本 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント BH-AC 200mg/body/㎡BA DEHPフリーのルートを使用。泡立てないよう注意 フィルタを用いずに投与する
		【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用	【滴下順:4】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分

日付		15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
注射															