レジメン名 CAG（C20＋A14+G75）div q3w
コメント **AML/MDS**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日
休薬完了	休薬完了							
注射	抗がん剤注射	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】
		【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分			
		【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アクラシノン注(ACR) 14 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 100 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント ACR 14mg/㎡@CAG療法	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アクラシノン注(ACR) 14 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 100 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント ACR 14mg/㎡@CAG療法	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アクラシノン注(ACR) 14 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 100 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント ACR 14mg/㎡@CAG療法	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アクラシノン注(ACR) 14 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 100 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント ACR 14mg/㎡@CAG療法			
		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG
		【滴下順:0】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント ACR後のリンス	【滴下順:0】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント ACR後のリンス	【滴下順:0】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント ACR後のリンス	【滴下順:0】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント ACR後のリンス			

日付		8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
															休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】	【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 フィルグラスチムBS注　75μgシリンジ 1 筒 用法 1日1回 注射フリーコメント【用時皮下注】						
		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@CAG						