レジメン名 LDAC 20 q3w div
コメント **AML/MDS**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日
休薬完了	休薬完了								
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC

日付		9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了													休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 20 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント AraC 20mg/㎡ div 24hr@LDAC							