**レジメン名** MEC(aged)(MIT10+VP16 div80+AraC80)q3w
**コメント** AML
**標準適用日数** 21日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 | 15病日 | 16病日 | 17病日 | 18病日 | 19病日 | 20病日 | 21病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【滴下順:1】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 【滴下順:1】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:1】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:1】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:1】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:2】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 ノバントロン注(MIT) 10 mg/㎡<br>生理食塩液 100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間30分<br>注射フリーコメント MIT 10mg/㎡ day1@MEC(aged) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:3】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 エトポシド注(VP-16) 80 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント VP-16 80mg/㎡ div@MEC(aged) | 【滴下順:2】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 エトポシド注(VP-16) 80 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント VP-16 80mg/㎡ div@MEC(aged) | 【滴下順:2】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 エトポシド注(VP-16) 80 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント VP-16 80mg/㎡ div@MEC(aged) | 【滴下順:2】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 エトポシド注(VP-16) 80 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント VP-16 80mg/㎡ div@MEC(aged) | 【滴下順:2】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 エトポシド注(VP-16) 80 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント VP-16 80mg/㎡ div@MEC(aged) | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:4】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:5】<br>手技 中心静脈(D)①-(白)<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 80 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間24時間<br>注射フリーコメント AraC 80mg/㎡@MEC(aged) | 【滴下順:0】<br>手技 中心静脈(D)①-(白)<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 80 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間24時間<br>注射フリーコメント AraC 80mg/㎡@<br>MEC(aged) | 【滴下順:0】<br>手技 中心静脈(D)①-(白)<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 80 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間24時間<br>注射フリーコメント AraC 80mg/㎡@<br>MEC(aged) | 【滴下順:0】<br>手技 中心静脈(D)①-(白)<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 80 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間24時間<br>注射フリーコメント AraC 80mg/㎡@<br>MEC(aged) | 【滴下順:0】<br>手技 中心静脈(D)①-(白)<br>薬品 キロサイド注(Ara-C) 80 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間24時間<br>注射フリーコメント AraC 80mg/㎡@<br>MEC(aged) | | | | | | | | | | | | |
| 治療 | 抗がん剤処方 | 般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap<br>内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap<br>内服1回 朝食後 2 日分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |