レジメン名 ACT-D 0.5 q2w
コメント 絨毛性疾患
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液パック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 204 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン③ 薬品 グラニセトロン点滴静注液パック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 204 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液パック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 204 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液パック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 204 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液パック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 204 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分									
		【適下順：0】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント コスメゲンと同時に側管より投与開始	【適下順：0】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント コスメゲンと同時に側管より投与開始	【適下順：0】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント コスメゲンと同時に側管より投与開始	【適下順：0】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント コスメゲンと同時に側管より投与開始	【適下順：0】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント コスメゲンと同時に側管より投与開始									
		【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★コスメゲン注(ACT-D) 0.5 mg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント コスメゲン1Vあたり水1.1mLで溶解し(0.5mg/mL)1mL採取	【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★コスメゲン注(ACT-D) 0.5 mg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント コスメゲン1Vあたり水1.1mLで溶解し(0.5mg/mL)1mL採取	【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★コスメゲン注(ACT-D) 0.5 mg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント コスメゲン1Vあたり水1.1mLで溶解し(0.5mg/mL)1mL採取	【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★コスメゲン注(ACT-D) 0.5 mg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント コスメゲン1Vあたり水1.1mLで溶解し(0.5mg/mL)1mL採取	【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★コスメゲン注(ACT-D) 0.5 mg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント コスメゲン1Vあたり水1.1mLで溶解し(0.5mg/mL)1mL採取									