レジメン名 CBDCA5+DOC70(DC)q3w
コメント 卵巣癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 開通確認用																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント DOC投与前にフラッシュ																				
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドセタキセル注(DOC･ｱﾙｺｰﾙﾌﾘｰ) 70 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント DOC 70mg/㎡@DC																				
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント CBDCA投与前にフラッシュ																				
		【滴下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) 5AUC ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント CBDCA 5 AUC@DC																				
		【滴下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 VDｿﾘﾀﾞT-3号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 166.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間3時間																				
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間 1 日分																				
		デカドロン錠0. 5mg 8錠 内服1回 22時に内服 1日分																				
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1cap 内服1回 朝食後 2日分																			
			デカドロン錠0. 5mg 16錠 内服2回 朝・夕食後 1日分																			
				デカドロン錠0. 5mg 8錠 内服1回 朝食後 1日分																		