**レジメン名** CBDCA5+PTX180（TC）q3w
**コメント** 卵巣癌、子宮頚癌、子宮体癌
**標準適用日数** 21日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 | 15病日 | 16病日 | 17病日 | 18病日 | 19病日 | 20病日 | 21病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間） 注入時間5分<br>注射フリーコメント 開通確認用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A<br>ボララミン注5mg／1mL 1 A<br>ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度） 時間当たり 148 ml/h<br>速度指示（時間） 注入時間30分<br>注射フリーコメント 初回のDEXAは20mg/bで投与 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間） 注入時間5分<br>注射フリーコメント パクリ前フラッシュ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:4】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 パクリタキセル点滴静注(PTX) 180 mg/㎡<br>ブドウ糖注　5%　500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間） 注入時間3時間<br>注射フリーコメント フィルタ付DEHPフリーのルートを使用<br>PTX 180mg/㎡@TC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:5】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間） 注入時間5分<br>注射フリーコメント カルボ前フラッシュ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:6】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) 5AUC<br>ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間） 注入時間2時間<br>注射フリーコメント CBDCA 5 AUC@TC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:7】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度） 時間当たり 166.6 ml/h<br>速度指示（時間） 注入時間3時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治療 | 抗がん剤処方 | 般）アプレピタントカプセル125mg 1 cap<br>内服1回　化学療法1～1.5時間 1 日分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 般）アプレピタントカプセル　80mg 1 cap<br>内服1回　朝食後 2 日分<br>化学療法2日目と3日目に内服 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |