レジメン名 CDDP40+RT(CCRT、1週間毎で6週間連投)q1w コメント 子宮頸癌 個準連用日数 7日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日
休菓完了	休菓完了							休菓完了
连射	抗心心刺注射	(海下県:1] 于技 特殊直滴来株メイン() 素魚 107/97-19輪液 500mL(%デム3) 1 本 用点 11日間 即 時間出り 250 m/n 速度無済・(前間) は 入時間空間 注射フリーコメル [水分負荷]						
		【第下順・2】 千技 特局企画来様メイン① 薬品 シリューゲンド輸営850の単ヴィーシ戸 1 本 ▼益酸料金庫では「他を/加上20ml.8 ml 用途 1日 1回 返費用示 (金貨) 時間当たり 254 m/n 返費用示 (等間) 注入時間2時間 注射フリーコメント 【水分負荷】						
		【海下順:3】 手技 特殊点滴来格片イン(7) 第高 アロキン 血瀬野送用バッグ0、75mg 1 袋 デキザー 上並前度 155mg/55mL(7 計 口) 3 A 用度 1日間 基度指示(速度) 時間出たり 208 m/h 温度指示(時間) 注入時間15分						
		【海下順・4】 于技 特殊点滴束用メイン】 デ技 特殊点滴束用メイン】 用点 1日 1回 高度 カーラー・ル注射度 (*D) 200 m/h 差を指示 (時間) 注入時間30分 注射フリーコメント フィルタ付ルートを使用						
		【海下順:5】 于技 特能点滴束根メイン(I) 素点 生增金组液 50mL 1 框 用点 (日 日 個 記 手間出入 500 mL/h 差を指示(日 個 注 入 400 mL/h 差を指示(日 個 注 入 400 mL/h 注 表 100 mL/h 主 表 100						
		(第7世 名) *技術経過素様メイン() 素品シスプラチン技(CODP) 40 mg/㎡ 素品シスプラチン技(CODP) 40 mg/㎡ 田東 (日日 図) 現成 (日日 図) 現成 (日日 図) 東西 (日田 図)						
		【海下陽:7】 于技 特殊直流来様本イン① 素急 リユーゲンド輸送500mL(ヴィンF) 1 本 用点 1日1回 高を指示(全型) 時間出上り200 m/h 急を指示(特別) 注入研究が開30分 注射フリーコルル 【水が食荷】						
		[海下級:8] 千技 神経直滴束棋ルイン() 落点 センリターの特施液 500mL(ルデム3) 1 本 海流 東京 (2郎) 時間 当とり 200 m/h 温度 東京 (名郎) 時間 当とり 200 m/h 温度 東京 (前別) と 入時間を間30分 注射 フリーコメント [水分負荷]						
		【海下陽:9】 于技 特裁直頭束柄メイン() 素造 リソニッケンド輸送500mL(ヴィンテ) 1 本 規止 [日1回 成産指示(定数) 時間当たり 125 m/h 速度指示(時間) 注入時間4時間						
			【適下陽:1】 干技 持続点滴束柄メイン(I) 素品 ヤクリヴィ・の号軸流 500mL(リルデム3) 1 本 メトウロブラミと注射液(の成/2mL(リソル・ラン) 1 A ポタロブラミと注射液(の成/2mL(リソル・ラン) 1 A 建度指示(の) 時間 またり 1686 m/n 速度指示(時間) 注入時間3時間					
		動)アブレビマットカブセル・25cms ten		【滴下順:1】 手技皮下注射 要品 アンサー皮下注20 μg ✓1mL 1 A 用法 1日1回				
治療	抗が人利処方	般) アブレビタントカブセル 125mg 1cap 内服 1個 化学療法1~1.5時間前 1日分	般)アプレビタントカブセル 80mg Loan					
			般)アプレビタントカブセル 80mg 1 cap 内銀1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服 デが「Dン管O. 5mg 16 管					
			デカドロン錠0.5mg 16錠 内限2回 朝 昼食後3日分 化学療法2日目から3日間内服					