

レジメン名 MTX0.4(絨毛性疾患)q2w
コメント 絨毛性疾患
標準適用日数 14日

		1 病 日	2 病 日	3 病 日	4 病 日	5 病 日	6 病 日	7 病 日	8 病 日	9 病 日	10 病 日	11 病 日	12 病 日	13 病 日	14 病 日
休業完了		休業完了													休業完了
注射	抗がん剤注射	【皮下注：1】 手技 筋内注射 薬品 メトトレキサート注(MTX) 0.4 mg/kg 注射用水 20mL 1 本 用法 1 日 1 回 注射フリーコメント MTX 50mgを注射用水2mLで溶解 このうち必要量を筋注 MTX 0.4mg/kg	【皮下注：1】 手技 筋内注射 薬品 メトトレキサート注(MTX) 0.4 mg/kg 注射用水 20mL 1 本 用法 1 日 1 回 注射フリーコメント MTX 50mgを注射用水2mLで溶解 このうち必要量を筋注 MTX 0.4mg/kg	【皮下注：1】 手技 筋内注射 薬品 メトトレキサート注(MTX) 0.4 mg/kg 注射用水 20mL 1 本 用法 1 日 1 回 注射フリーコメント MTX 50mgを注射用水2mLで溶解 このうち必要量を筋注 MTX 0.4mg/kg	【皮下注：1】 手技 筋内注射 薬品 メトトレキサート注(MTX) 0.4 mg/kg 注射用水 20mL 1 本 用法 1 日 1 回 注射フリーコメント MTX 50mgを注射用水2mLで溶解 このうち必要量を筋注 MTX 0.4mg/kg	【皮下注：1】 手技 筋内注射 薬品 メトトレキサート注(MTX) 0.4 mg/kg 注射用水 20mL 1 本 用法 1 日 1 回 注射フリーコメント MTX 50mgを注射用水2mLで溶解 このうち必要量を筋注 MTX 0.4mg/kg									