レジメン名 NED 80 q4w
コメント 卵巣癌、子宮頸癌
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																											
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(デカドロン) 3 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 206 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																											
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント アクプラ前フラッシュ																											
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★アクプラ注 80 mg/㎡ 生理食塩液　500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント【要遮光】 NED 80mg/㎡																											
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-1号輸液　500mL(ソルデム1) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																											
		【滴下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																											