レジメン名 PLD(Doxil)40 q4w コメント 卵巣癌 標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	
休薬完了 休薬完了																												休薬完了
注射	抗が仏剤注射	【強下順:1】 手技 持続点滴末構メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(前原) 注入時間分 注射プリーコメント 関連確認用																										
		【海下順:2】 手技 持級点 海末構メイン① 乗品 グラニセトロン点 演奏注流 バック1 mg/50mL 1 袋 デキサード主射液6 6mg/2ml(デが ロン) 1 V デキサート主射液165mg/0ml(デが ロン) 2 A 用法 1日 1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																										
		[満下順:3] 手技 持続点滴末梢メイン① 乗品 ブドウ糖注 5% 50mL 用法 1日 回 進度排示(選集) 時間当たり 200 ml/h 進度排示(等間) 注入時間15分 注射 フリーコメントドキシル、前フラッシュ																										
		【満下順・4】  手技 持続点滴末構メイン①  素品 ドキンル注作LD/本/リホ 化DXR) 40 mg/m ブドウ酸注 5% 250mL 1 袋 用法 旧日回 選度指示(時間) 注入時間1時間30分 注急材プリーメント 90mg/bを超えた場合。ブに高減時間延長する 1mg/分の速度以下で高減時で 「フィルタ使用禁止」 ドキシル役与中は両手掌 足底を冷却する (DXRの影技多量確認!]																										
		【海下順:5】 手技 持続点海末梢メイン① 葉品 ブドウ糖注 5% 50 mL 用法 日1回 速度指示(速度)時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 後フラッシュ用																										