

レジメン名 wPTX80+Bev15 q4w
 コメント 卵巣癌
 標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休業完了	休業完了																											休業完了	
注射	抗がん剤注射	<p>【滴下線:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 前送確認用</p>							<p>【滴下線:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 前送確認用</p>							<p>【滴下線:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 前送確認用</p>													
		<p>【滴下線:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニューロシ点静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6mg/2mL(7.5%^{1D}) 1 V ホシラン注5mg/1mL 1 A ファモチジン注20mg/NS20mL (カクサ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 292 ml/h 速度指示(時間)</p>							<p>【滴下線:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニューロシ点静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6mg/2mL(7.5%^{1D}) 1 V ホシラン注5mg/1mL 1 A ファモチジン注20mg/NS20mL (カクサ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 292 ml/h 速度指示(時間)</p>							<p>【滴下線:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニューロシ点静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6mg/2mL(7.5%^{1D}) 1 V ホシラン注5mg/1mL 1 A ファモチジン注20mg/NS20mL (カクサ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 292 ml/h 速度指示(時間)</p>													
		<p>【滴下線:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント バクリ前フラッシュ</p>							<p>【滴下線:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント バクリ前フラッシュ</p>							<p>【滴下線:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント バクリ前フラッシュ</p>													
		<p>【滴下線:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 バクリタキセル点静注(PTX) 80 mg/ml ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間 時間 注射フリーコメント フィルタ付DEHPフリーのルートを使用 PTX 80mg/ml@wPTX+Bev</p>							<p>【滴下線:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 バクリタキセル点静注(PTX) 80 mg/ml ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間 時間 注射フリーコメント フィルタ付DEHPフリーのルートを使用 PTX 80mg/ml@wPTX+Bev</p>							<p>【滴下線:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 バクリタキセル点静注(PTX) 80 mg/ml ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間 時間 注射フリーコメント フィルタ付DEHPフリーのルートを使用 PTX 80mg/ml@wPTX+Bev</p>													
		<p>【滴下線:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント Bev前フラッシュ</p>														<p>【滴下線:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント Bev前フラッシュ</p>													
		<p>【滴下線:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスタシ注(Bev) 15 mg/kg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間 時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、それ以降30分で投与可能 Bev 15mg/kg @wPTX+Bev</p>														<p>【滴下線:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスタシ注(Bev) 15 mg/kg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間 時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、それ以降30分で投与可能 Bev 15mg/kg @wPTX+Bev</p>													
		<p>【滴下線:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス</p>							<p>【滴下線:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス</p>							<p>【滴下線:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス</p>													