**レジメン名** BEP q3w
**コメント** 胚細胞腫瘍
**標準適用日数** 21日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 | 15病日 | 16病日 | 17病日 | 18病日 | 19病日 | 20病日 | 21病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 アクチット輸液500mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5時間 | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 アクチット輸液500mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5時間 | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 アクチット輸液500mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5時間 | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 アクチット輸液500mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5時間 | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 アクチット輸液500mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5時間 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 アクチット輸液500mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5時間 | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 アクチット輸液500mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5時間 | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 アクチット輸液500mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5時間 | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 アクチット輸液500mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5時間 | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 アクチット輸液500mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5時間 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:3】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:3】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:3】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:3】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:3】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | | | | 【滴下順:1】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | | | | | | | 【滴下順:1】<br>手技 点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | | | | | |
| | | 【滴下順:4】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:4】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:4】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:4】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | 【滴下順:4】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間15分 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 【滴下順:5】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ブレオ注(BLM) 30 mg<br>生理食塩液 100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間30分<br>注射フリーコメント BLM 30mg/body | | | | | | | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ブレオ注(BLM) 30 mg<br>生理食塩液 100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間30分<br>注射フリーコメント BLM 30mg/body | | | | | | | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ブレオ注(BLM) 30 mg<br>生理食塩液 100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間30分<br>注射フリーコメント BLM 30mg/body | | | | | |
| | | 【滴下順:5】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 シスプラチン注(CDDP) 20 mg/㎡<br>生理食塩液 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント CDDP 20mg/㎡<br>【要遮光】 | 【滴下順:6】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 シスプラチン注(CDDP) 20 mg/㎡<br>生理食塩液 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント CDDP 20mg/㎡<br>【要遮光】 | 【滴下順:5】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 シスプラチン注(CDDP) 20 mg/㎡<br>生理食塩液 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント CDDP 20mg/㎡<br>【要遮光】 | 【滴下順:5】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 シスプラチン注(CDDP) 20 mg/㎡<br>生理食塩液 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント CDDP 20mg/㎡<br>【要遮光】 | 【滴下順:5】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 シスプラチン注(CDDP) 20 mg/㎡<br>生理食塩液 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント CDDP 20mg/㎡<br>【要遮光】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:6】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント VP-16 100mg/㎡※BEP療法<br>DEHPフリーのルートを使用 | 【滴下順:7】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント VP-16 100mg/㎡※BEP療法<br>DEHPフリーのルートを使用 | 【滴下順:6】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント VP-16 100mg/㎡※BEP療法<br>DEHPフリーのルートを使用 | 【滴下順:6】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント VP-16 100mg/㎡※BEP療法<br>DEHPフリーのルートを使用 | 【滴下順:6】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡<br>ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間2時間<br>注射フリーコメント VP-16 100mg/㎡※BEP療法<br>DEHPフリーのルートを使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:7】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｰﾝD) 1 本<br>プロセミド注20mg/2mL(ラックス) 10 mg<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 250.5 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間2時間 | 【滴下順:8】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｰﾝD) 1 本<br>プロセミド注20mg/2mL(ラックス) 10 mg<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 250.5 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間2時間 | 【滴下順:7】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｰﾝD) 1 本<br>プロセミド注20mg/2mL(ラックス) 10 mg<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 250.5 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間2時間 | 【滴下順:7】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｰﾝD) 1 本<br>プロセミド注20mg/2mL(ラックス) 10 mg<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 250.5 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間2時間 | 【滴下順:7】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｰﾝD) 1 本<br>プロセミド注20mg/2mL(ラックス) 10 mg<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 250.5 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間2時間 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:8】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 125 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間4時間<br>注射フリーコメント 24時に終了するように調整 | 【滴下順:9】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 125 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間4時間<br>注射フリーコメント 24時に終了するように調整 | 【滴下順:8】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 125 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間4時間<br>注射フリーコメント 24時に終了するように調整 | 【滴下順:8】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 125 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間4時間<br>注射フリーコメント 24時に終了するように調整 | 【滴下順:8】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 125 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間4時間<br>注射フリーコメント 24時に終了するように調整 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:9】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 125 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間4時間<br>注射フリーコメント 24時に終了するように調整 | 【滴下順:10】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 125 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間4時間<br>注射フリーコメント 24時に終了するように調整 | 【滴下順:9】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 125 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間4時間<br>注射フリーコメント 24時に終了するように調整 | 【滴下順:9】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 125 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間4時間<br>注射フリーコメント 24時に終了するように調整 | 【滴下順:9】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ラクテック注(輸液)500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 125 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間4時間<br>注射フリーコメント 24時に終了するように調整 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | | | | | | | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | | | | | |
| 治療 | 抗がん剤処方 | 般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap<br>内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap<br>内服1回 朝食後 2 日分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |