レジメン名 Cabazitxcel 25 q3w
コメント 前立腺がん
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V ポララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 292 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ジェブタナ点滴静注 25 mg/㎡ 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント 輸液は25～65mg/bまで250mL、以降は500mL フィルタ付 DEHPフリーのルートを使用 CBZ　25mg/㎡																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																				
治療	抗がん剤処方	プレドニン錠【5mg】2 錠 内服1回　朝食後 21 日分 CBZ　25mg/㎡																				