レジメン名 CBDCA 5+GEM 1000 q4w
コメント 膀胱がん
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　１００ｍＬ 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 408 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分							【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　１００ｍＬ 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 408 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分							【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　１００ｍＬ 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 408 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分													
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ゲムシタビン(GEM)点滴静注用(40mg/mL) 1000 mg/㎡ 生理食塩液　１００ｍＬ 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント【必ず30分で落として下さい】 GEM 1000mg/㎡@GEM+CBDCA療法							【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ゲムシタビン(GEM)点滴静注用(40mg/mL) 1000 mg/㎡ 生理食塩液　１００ｍＬ 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント【必ず30分で落として下さい】 GEM 1000mg/㎡@GEM+CBDCA療法							【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ゲムシタビン(GEM)点滴静注用(40mg/mL) 1000 mg/㎡ 生理食塩液　１００ｍＬ 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント【必ず30分で落として下さい】 GEM 1000mg/㎡@GEM+CBDCA療法													
			【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT－３号輸液　５００ｍＬ(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 ▼硫酸Mg補正液（1mEq/mL）20mL 8 ml 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 127 ml/h 速度指示（時間） 注入時間4時間																										
			【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ０．７５ｍｇ 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 212 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分																										
			【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 マンニットール注射液「YD」20%300mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 300 ml/h 速度指示（時間） 注入時間1時間 注射フリーコメント フィルタ付ルートを使用																										
			【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:5 ブドウ糖注　５％　２５０ｍＬ 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間2時間 注射フリーコメント CBDCA 5AUC @GEM+CBDCA療法																										
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT－３号輸液　５００ｍＬ(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回																											
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT－３号輸液　５００ｍＬ(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回																											
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT－３号輸液　５００ｍＬ(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 24:00で終了するように調整																											
			【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液５００ｍＬ(ｳﾞｨｰﾝF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 166.6 ml/h 速度指示（時間） 注入時間3時間																										
			【滴下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液５００ｍＬ(ｳﾞｨｰﾝF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 125 ml/h 速度指示（時間） 注入時間4時間																										
				【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液５００ｍＬ(ｳﾞｨｰﾝF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液５００ｍＬ(ｳﾞｨｰﾝF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間																									
				【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT－３号輸液　５００ｍＬ(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT－３号輸液　５００ｍＬ(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間																									
				【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液５００ｍＬ(ｳﾞｨｰﾝF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液５００ｍＬ(ｳﾞｨｰﾝF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間																									
				【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT－３号輸液　５００ｍＬ(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間	【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT－３号輸液　５００ｍＬ(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間																									
									【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　５０ｍＬ 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス							【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　５０ｍＬ 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス													
治療	抗がん剤処方		般）アプレピタントカプセル１２５ｍｇ 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分																										
				デカドロン錠０．５ｍｇ 16 錠 内服2回　朝・昼食後 2 日分																									
				般）アプレピタントカプセル　８０ｍｇ 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分																									