レジメン名 CBDCA5+PTX180(TC) q3w
コメント 尿路上皮がん
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ソルデム3) 1 本 ▼硫酸Mg補正液（1mEq/mL）20mL 8 ml 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 254 ml/h 速度指示（時間）注入時間2時間																				
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A ポララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL（ｶﾞｽﾀｰ）1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 148 ml/h 速度指示（時間）注入時間30分																				
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント パクリ前フラッシュ																				
		【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 パクリタキセル点滴静注(PTX) 180 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間3時間 注射フリーコメント フィルタ付 DEHPフリーのルートを使用 PTX 180mg/㎡@TC療法																				
		【適下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 マンニットール注射液「YD」20%300mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 300 ml/h 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント フィルタ付ルートを使用																				
		【適下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) 0 mg/AUC：5 ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント CBDCA 5AUC @TC																				
		【適下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 166.6 ml/h 速度指示（時間）注入時間3時間																				
		【適下順:8】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 166.6 ml/h 速度指示（時間）注入時間3時間																				
			【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間）注入時間6時間	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間）注入時間6時間																		
			【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間）注入時間6時間	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間）注入時間6時間																		
			【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間）注入時間6時間	【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間）注入時間6時間																		
			【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間）注入時間6時間	【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間）注入時間6時間																		
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分																				
			デカドロン錠0．5mg 16 錠 内服2回　朝・昼食後 2 日分																			
			般)アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分																			