レジメン名 CDDP70+GEM1000 (GC) q4w
コメント 膵胚がん
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 408 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分							【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 408 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分							【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 408 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分															
		【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ゲムシタビン(GEM)点滴静注用(40mg/mL) 1000 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント【必ず30分で落として下さい】 GEM 1000mg/㎡@GC療法							【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ゲムシタビン(GEM)点滴静注用(40mg/mL) 1000 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント【必ず30分で落として下さい】 GEM 1000mg/㎡@GC療法							【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ゲムシタビン(GEM)点滴静注用(40mg/mL) 1000 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント【必ず30分で落として下さい】 GEM 1000mg/㎡@GC療法														
		【適下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ﾌﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回																											
		【適下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ﾌﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回																											
		【適下順：5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ﾌﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 24:00で終了するように調整																											
			【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス							【適下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス															
			【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ﾌﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 125 ml/h 速度指示（時間） 注入時間4時間																										
			【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ﾌﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 ▼硫酸Mg補正液(1mEq/mL)20mL 8 ml 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 127 ml/h 速度指示（時間） 注入時間4時間																										
			【適下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 212 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分																										
			【適下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 マンニットール注射液TYD 20%300mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 300 ml/h 速度指示（時間） 注入時間1時間 注射フリーコメント フィルタ付のルートを使用																										
			【適下順：5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 シスプラチン注(CDDP) 70 mg/㎡ 生理食塩液　500mL 300 mL 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間2時間 注射フリーコメント CDDP 70mg/㎡@GC療法 【希釈液】 生食200mLを抜いて調製																										
			【適下順：6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 166.6 ml/h 速度指示（時間） 注入時間3時間																										
			【適下順：7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 125 ml/h 速度指示（時間） 注入時間4時間																										
			【適下順：8】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 125 ml/h 速度指示（時間） 注入時間4時間																										
				【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間	【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間																									
				【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ﾌﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間	【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ﾌﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間																									
				【適下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間	【適下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間																									
				【適下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ﾌﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間	【適下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ﾌﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 83.3 ml/h 速度指示（時間） 注入時間6時間																									
治療	抗がん剤処方		般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分																										
				般)アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																									
				デカドロン錠0．5mg 16 錠 内服2回　朝・昼食後 3 日分 化学療法2日目から3日間内服																									