レジメン名 Nivolumab 240+Ipilimumab 1 q3w
コメント 腎細胞がん
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間)																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 オプジーボ点滴静注(10mg/mL) 240 mg 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 248 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント フィルタ付ルートを使用 Nivolumab 240mg/b@Nivolumab+Ipilimumab																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント NivoとIpiの間は必ず30分以上空ける																				
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ヤーボイ点滴静注用(5mg/mL) 1 mg/kg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント 生食100mlから全量抜き、空瓶にする。 1mg/mLの溶液から必要量を採取し、空瓶に充填する。 ※　Bw 50kg未満には50mLのボトルを考慮する。 薬液量:ヤーボイ 1mg＝1mL Ipilimumab 1mg/kg@Nivolumab+Ipilimumab																				
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 15分以上かけてリンス																				