レジメン名 A-AVD q4w
コメント HL
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分														【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分													
		【滴下順:0】 手技 ワンショット静脈注射 薬品 エクザール注(VLB) 6 mg/㎡ 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント VBR 6mg/㎡ (max10mg/body)@A-AVD療法 生食はVBRの投与量に合わせて1mg/mLで調製														【滴下順:0】 手技 ワンショット静脈注射 薬品 エクザール注(VLB) 6 mg/㎡ 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント VBR 6mg/㎡ (max10mg/body)@A-AVD療法 生食はVBRの投与量に合わせて1mg/mLで調製													
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR･ADR) 25 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント DOX 25mg/㎡@A-AVD														【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR･ADR) 25 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント DOX 25mg/㎡@A-AVD													
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ダカルバジン注(DTIC) 375 mg/㎡ 注射用水100mL 1 瓶 ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント ルートを含めて全てを遮光する。 DTIC 375mg/㎡@A-AVD DTIC 100mgにつき注射用水10mLで溶解する														【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ダカルバジン注(DTIC) 375 mg/㎡ 注射用水100mL 1 瓶 ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント ルートを含めて全てを遮光する。 DTIC 375mg/㎡@A-AVD DTIC 100mgにつき注射用水10mLで溶解する													
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 サクシゾン注100mg(ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ／ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント アドセトリスの前に点滴														【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 サクシゾン注100mg(ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ／ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント アドセトリスの前に点滴													
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★アドセトリス点滴静注用50mg 1.2 mg/kg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水　20mL 1 本 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント Brentuximab vedotin 1.2mg/kg@A-AVD ※体重が100kgを超える場合は120mg/bとなります。 1Vにつき注射用水10.5mL(濃度5mg/mL)で溶解する。														【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★アドセトリス点滴静注用50mg 1.2 mg/kg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水　20mL 1 本 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント Brentuximab vedotin 1.2mg/kg@A-AVD ※体重が100kgを超える場合は120mg/bとなります。 1Vにつき注射用水10.5mL(濃度5mg/mL)で溶解する。													
		【滴下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス														【滴下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス													
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分																											
			般)アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分																										
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回　朝･昼食後 3 日分																										
																般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分														
																	般)アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分												
																	デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回　朝･昼食後 3 日分												