

レジメン名 Rituximab @1w(リツキサン緊急使用)
 コメント ネフローゼ
 標準適用日数 7日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日
休薬完了	休薬完了							休薬完了
注射	抗がん剤注射	<p>【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アセリオ静注液バッグ1000mg/100mL 500 mg ポラミン注5mg/1mL 1 A サクシゾン注100mg(ヒドロコルチゾン/ソル・コステフ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント アセリオから50mL抜いてから調製(500mg/b)</p>						
		<p>【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★リツキサン点滴静注(10mg/mL) 375 mg/m² 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 50 ml/h 注射フリーコメント Rituximab 375mg/m² @Rituximab ネフローゼ用 * * * * * 初回投与時 * * * * * 最初の30分は50mL/hで投与開始。 30分毎に50mL/hずつ上げて投与可能。 問題なければ400mL/hまで上昇可能。 * * * 2回目以降(初回の副作用が軽微の場合) * * * 最初の30分は100mL/hで投与開始可能。 30分毎に100mL/hずつ上げて投与可能。 問題なければ400mL/hまで上昇可能。</p>						
		<p>【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス</p>						