レジメン名 DBd #4～8 q3w
コメント **MM**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@DBd #4～8 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)			【適下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@DBd #4～8 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)				【適下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@DBd #4～8 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)			【適下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@DBd #4～8 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)										
		【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アセリオ静注液バッグ1000mg／100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A ボララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間15分																				
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★ダラザレックス点滴静注 16 mg/kg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5時間 注射フリーコメント Dara 16mg/kg day1,8,15@DBd #4～8 フィルタ付きルートを用いて投与 infusion reactionが発現しなかった場合 1時間毎に以下の投与速度に上昇可能 100mL/h→150mL/h→200mL/h(max) infusion reaction後は半分の速度から再開																				
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																				
治療	抗がん剤処方		レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 1 日分 DEXA 20mg/body day2@DBd療法 #4～8																			
					レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 2 日分 DEXA 20mg/body day4,5@DBd療法 #4～8																	
									レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 2 日分 DEXA 20mg/body day8,9@DBd療法 #4～8												
												レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 2 日分 DEXA 20mg/body day11,12@DBd療法 #4～8										