レジメン名 DVMP #1 q6w
コメント **MM**
標準適用日数 42日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日	29病日	30病日	31病日	32病日	33病日	34病日	35病日	36病日	37病日	38病日	39病日	40病日	41病日	42病日
休薬完了	休薬完了																																										休薬完了
注射	抗がん剤注射	【薬下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@DVMP #1 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)			【薬下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@DVMP #1 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)				【薬下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@DVMP #1 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)			【薬下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@DVMP #1 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)											【薬下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@DVMP #1 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)			【薬下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@DVMP #1 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)			【薬下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@DVMP #1 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)																			
		【薬下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アセリオ静注液/バッグ1000mg／100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ドカ ドロ)2 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ドカ ドロ)2 A ポララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間15分							【薬下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アセリオ静注液/バッグ1000mg／100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ドカ ドロ)2 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ドカ ドロ)2 A ポララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間15分						【薬下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アセリオ静注液/バッグ1000mg／100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ドカ ドロ)2 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ドカ ドロ)2 A ポララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間15分											【薬下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アセリオ静注液/バッグ1000mg／100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ドカ ドロ)2 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ドカ ドロ)2 A ポララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間15分						【薬下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アセリオ静注液/バッグ1000mg／100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ドカ ドロ)2 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ドカ ドロ)2 A ポララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間15分						
		【薬下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★ダラザレックス点滴静注 16 mg/kg 医療従事者向けコメント 凸冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間20時間 注射フリーコメント Dara 16mg/kg day1@DVMP#1 フィルタ付きルートを用いて投与 1時間毎に以下の順で投与速度に上昇可能 50mL/h→100mL/h→150mL/h→200mL/h(max) infusion reaction後は半分の速度から再開																																										
									【薬下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★ダラザレックス点滴静注 16 mg/kg 医療従事者向けコメント 凸冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間20時間 注射フリーコメント Dara 16mg/kg day6以降@DVMP#1 フィルタ付きルートを用いて投与 1時間毎に以下の順で投与速度に上昇可能 50mL/h→100mL/h→150mL/h→200mL/h(max) 【初回投与3時間以内にInfusionreactionを発現した→場合、生理300mL→1000mLに変更する。】 infusion reaction後は半分の速度から再開																																										
																【薬下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★ダラザレックス点滴静注 16 mg/kg 医療従事者向けコメント 凸冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間10時間 注射フリーコメント Dara 16mg/kg day15以降@DVMP#1 フィルタ付きルートを用いて投与 infusion reactionが発現しなかった場合 1時間毎に以下の順で投与速度に上昇可能 100mL/h→150mL/h→200mL/h(max) 初回infusion reactionあれば生食1Lを用いる infusion reaction後は半分の速度から再開											【薬下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★ダラザレックス点滴静注 16 mg/kg 医療従事者向けコメント 凸冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間10時間 注射フリーコメント Dara 16mg/kg day15以降@DVMP#1 フィルタ付きルートを用いて投与 infusion reactionが発現しなかった場合 1時間毎に以下の順で投与速度に上昇可能 100mL/h→150mL/h→200mL/h(max) 初回infusion reactionあれば生食1Lを用いる infusion reaction後は半分の速度から再開											【薬下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★ダラザレックス点滴静注 16 mg/kg 医療従事者向けコメント 凸冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間10時間 注射フリーコメント Dara 16mg/kg day15以降@DVMP#1 フィルタ付きルートを用いて投与 infusion reactionが発現しなかった場合 1時間毎に以下の順で投与速度に上昇可能 100mL/h→150mL/h→200mL/h(max) 初回infusion reactionあれば生食1Lを用いる infusion reaction後は半分の速度から再開						
		【薬下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント ソース							【薬下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント ソース						【薬下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント ソース											【薬下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント ソース						【薬下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント ソース						
治療	抗がん剤処方	殺)モンテルカスト+OD錠10mg 1 錠 内服1回　ダラザレックスの1時間前 1 日分 @DVMP #1 day1																																										
		アルケラン錠2mg 8mg/㎡ 内服1回　朝食前 4 日分 L-PAM 8mg/㎡ day1~4@DVMP																																										
			プレドニン錠【5mg】 60mg/㎡ 内服2回　朝・昼食後 3 日分 PSL 60mg/㎡ day2~4@DVMP																																										