

レジメン名 EPd用エロツズマブ q4w #1.2用(d1,8,15,22)
 コメント MM
 標準適用日数 28日

日付	1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	2病日	3病日	4病日	15病日	16病日	7病日	8病日	9病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日					
休薬完了 休薬完了 当日確認 当日実施確認																												休薬完了					
	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 デキストラン注射液6.6mg/2mL(7かド) 5 V ポララミン注5mg/1mL 1 A ファミチジン注20mg/NS20mL(カスター) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 324 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 各薬剤毎に異なるシリンジを用いること						【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 デキストラン注射液6.6mg/2mL(7かド) 5 V ポララミン注5mg/1mL 1 A ファミチジン注20mg/NS20mL(カスター) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 324 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 各薬剤毎に異なるシリンジを用いること							【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 デキストラン注射液6.6mg/2mL(7かド) 5 V ポララミン注5mg/1mL 1 A ファミチジン注20mg/NS20mL(カスター) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 324 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 各薬剤毎に異なるシリンジを用いること																			
	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エムブリンチ点滴静注 10 mg/kg 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 30 ml/h 注射フリーコメント Eliotuzumab 10mg/kg@EPd療法 フィルタを用いて投与 #1 day1のみ30mL/hで開始、30分間 30分以降問題なければ60mL/hで30分間 60分以降問題なければ120mL/hまで上昇可 #1 day8以降180mL/hから投与開始、30分間 30分以降問題なければ240mL/hまで上昇可 #1 day15以降は300mL/hで投与する Elo 400mg未満:生食100mL抜いて調製 Elo 400~459mg:生食50mL抜いて調製 Elo 460mg以上:生食抜かずに調製						【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エムブリンチ点滴静注 10 mg/kg 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 30 ml/h 注射フリーコメント Eliotuzumab 10mg/kg@EPd療法 フィルタを用いて投与 #1 day1のみ30mL/hで開始、30分間 30分以降問題なければ60mL/hで30分間 60分以降問題なければ120mL/hまで上昇可 #1 day8以降180mL/hから投与開始、30分間 30分以降問題なければ240mL/hまで上昇可 #1 day15以降は300mL/hで投与する Elo 400mg未満:生食100mL抜いて調製 Elo 400~459mg:生食50mL抜いて調製 Elo 460mg以上:生食抜かずに調製							【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エムブリンチ点滴静注 10 mg/kg 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 30 ml/h 注射フリーコメント Eliotuzumab 10mg/kg@EPd療法 フィルタを用いて投与 #1 day1のみ30mL/hで開始、30分間 30分以降問題なければ60mL/hで30分間 60分以降問題なければ120mL/hまで上昇可 #1 day8以降180mL/hから投与開始、30分間 30分以降問題なければ240mL/hまで上昇可 #1 day15以降は300mL/hで投与する Elo 400mg未満:生食100mL抜いて調製 Elo 400~459mg:生食50mL抜いて調製 Elo 460mg以上:生食抜かずに調製																			
	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス						【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス								【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																		
	【滴下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 サクソゾン注100mg(tドコルゾン/フルコナー) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【★★★ 頓用 ★★★】 EIA7リチのinfusion reaction出現時 全開で投与						【滴下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 サクソゾン注100mg(tドコルゾン/フルコナー) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【★★★ 頓用 ★★★】 EIA7リチのinfusion reaction出現時 全開で投与							【滴下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 サクソゾン注100mg(tドコルゾン/フルコナー) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【★★★ 頓用 ★★★】 EIA7リチのinfusion reaction出現時 全開で投与																			
治療	抗がん剤処方							般)アセトアミノフェン錠200mg 3錠 頓服 プレメディ投与と同時に内服 1回分							般)アセトアミノフェン錠200mg 3錠 頓服 プレメディ投与と同時に内服 1回分																		