レジメン名 EPd用エロツズマブ q4w #10以降(d1)
コメント MM
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
当日確認	当日実施確認																												
		【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V ポララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 324 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 各薬剤毎に異なるシリンジを用いること																											
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エムプリシティ点滴静注 20 mg/kg 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 300 ml/h 注射フリーコメント Elotuzumab 20mg/kg@EPd療法 フィルタを用いて投与 #3は180mL/hで開始、30分後240mL/hまで上昇可能 #4以降は300mL/hで投与する Elo 1000mg未満:生食100mL抜いて調製 Elo 1000以上～1800mg未満:そのまま調製 Elo 1800mg以上:生食500mLから150mL抜いて調製																											
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																											
		【滴下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 サクシゾン注100mg(ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ／ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【 ★★★ 頓用 ★★★ 】 ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨのinfusion reaction出現時 全開で投与																											
		般)アセトアミノフェン錠200mg 3 錠 頓服 プレメディ投与と同時に内服 1 回分 @EPd療法																											
									レナデックス錠4mg 10 錠 内服1回 朝食後 1 日分 DEXA 40mg/b day8@EPd療法																				
																レナデックス錠4mg 10 錠 内服1回 朝食後 1 日分 DEXA 40mg/b day8@EPd療法														