レジメン名 ERd q4w #1,2用(d1,8,15,22)
コメント MM
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾞﾛﾝ) 5 V ボララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 324 ml/h 速度指示（時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 各薬剤毎に異なるシリンジを用いること							【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾞﾛﾝ) 5 V ボララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 324 ml/h 速度指示（時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 各薬剤毎に異なるシリンジを用いること							【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾞﾛﾝ) 5 V ボララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 324 ml/h 速度指示（時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 各薬剤毎に異なるシリンジを用いること							【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾞﾛﾝ) 5 V ボララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 324 ml/h 速度指示（時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 各薬剤毎に異なるシリンジを用いること							
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エムプリシティ点滴静注 10 mg/kg 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 30 ml/h 注射フリーコメント Elotuzumab 10mg/kg@ERd療法 フィルタを用いて投与 #1 day1のみ30mL/hで開始, 30分間 30分以降問題なければ60mL/hで30分間 60分以降問題なければ120mL/hまで上昇可 #1 day8以降180mL/hから投与開始、30分間 30分以降問題なければ240mL/hまで上昇可 #1 day15以降は300mL/hで投与する Elo 400mg未満：生食100mL抜いて調製 Elo 400～459mg：生食50mL抜いて調製 Elo 460mg以上：生食抜かずに調製							【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エムプリシティ点滴静注 10 mg/kg 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 30 ml/h 注射フリーコメント Elotuzumab 10mg/kg@ERd療法 フィルタを用いて投与 #1 day1のみ30mL/hで開始, 30分間 30分以降問題なければ60mL/hで30分間 60分以降問題なければ120mL/hまで上昇可 #1 day8以降180mL/hから投与開始、30分間 30分以降問題なければ240mL/hまで上昇可 #1 day15以降は300mL/hで投与する Elo 400mg未満：生食100mL抜いて調製 Elo 400～459mg：生食50mL抜いて調製 Elo 460mg以上：生食抜かずに調製							【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エムプリシティ点滴静注 10 mg/kg 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 30 ml/h 注射フリーコメント Elotuzumab 10mg/kg@ERd療法 フィルタを用いて投与 #1 day1のみ30mL/hで開始, 30分間 30分以降問題なければ60mL/hで30分間 60分以降問題なければ120mL/hまで上昇可 #1 day8以降180mL/hから投与開始、30分間 30分以降問題なければ240mL/hまで上昇可 #1 day15以降は300mL/hで投与する Elo 400mg未満：生食100mL抜いて調製 Elo 400～459mg：生食50mL抜いて調製 Elo 460mg以上：生食抜かずに調製							【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エムプリシティ点滴静注 10 mg/kg 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 30 ml/h 注射フリーコメント Elotuzumab 10mg/kg@ERd療法 フィルタを用いて投与 #1 day1のみ30mL/hで開始, 30分間 30分以降問題なければ60mL/hで30分間 60分以降問題なければ120mL/hまで上昇可 #1 day8以降180mL/hから投与開始、30分間 30分以降問題なければ240mL/hまで上昇可 #1 day15以降は300mL/hで投与する Elo 400mg未満：生食100mL抜いて調製 Elo 400～459mg：生食50mL抜いて調製 Elo 460mg以上：生食抜かずに調製							
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス							【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス							【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス							【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス							
		【適下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 サクシゾン注100mg(ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ/ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【 ★★★ 頓用 ★★★ 】 ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨのinfusion reaction出現時 全開で投与							【適下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 サクシゾン注100mg(ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ/ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【 ★★★ 頓用 ★★★ 】 ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨのinfusion reaction出現時 全開で投与							【適下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 サクシゾン注100mg(ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ/ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【 ★★★ 頓用 ★★★ 】 ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨのinfusion reaction出現時 全開で投与							【適下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 サクシゾン注100mg(ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ/ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【 ★★★ 頓用 ★★★ 】 ｴﾑﾌﾟﾘｼﾃｨのinfusion reaction出現時 全開で投与							
治療	抗がん剤処方	レブラミドカプセル5mg 5 cap 内服1回　就寝前 21 日分 Lenalidomide p.o. day1-21 @ERd療法 必）腎機能に応じて用量調節																											
		般）アセトアミノフェン錠200mg 3 錠 頓服　プレメディ投与と同時に内服 1 回分 @ERd療法																											
									般）アセトアミノフェン錠200mg 3 錠 頓服　プレメディ投与と同時に内服 1 回分 @ERd療法																		
																般）アセトアミノフェン錠200mg 3 錠 頓服　プレメディ投与と同時に内服 1 回分 @ERd療法															
																							般）アセトアミノフェン錠200mg 3 錠 頓服　プレメディ投与と同時に内服 1 回分 @ERd療法							