レジメン名 ERd q4w #3以降(d1,15)
コメント **MM**
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V ポララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 324 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 各薬剤毎に異なるシリンジを用いること														【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V ポララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 324 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 各薬剤毎に異なるシリンジを用いること													
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エムブリシティ点滴静注 10 mg/kg 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 300 ml/h 注射フリーコメント Elotuzumab 10mg/kg@ERd療法 フィルタを用いて投与 #3以降は300mL/hで投与する Elo 400mg未満:生食100mL抜いて調製 Elo 400～459mg:生食50mL抜いて調製 Elo 460mg以上:生食抜かずに調製														【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エムブリシティ点滴静注 10 mg/kg 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 300 ml/h 注射フリーコメント Elotuzumab 10mg/kg@ERd療法 フィルタを用いて投与 #3以降は300mL/hで投与する Elo 400mg未満:生食100mL抜いて調製 Elo 400～459mg:生食50mL抜いて調製 Elo 460mg以上:生食抜かずに調製													
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス														【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス													
		【滴下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 サクシゾン注100mg(ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ／ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【 ★★★ 頓用 ★★★ 】 ｴﾑﾌﾞﾘｼﾃｨのinfusion reaction出現時 全開で投与														【滴下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 サクシゾン注100mg(ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ／ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【 ★★★ 頓用 ★★★ 】 ｴﾑﾌﾞﾘｼﾃｨのinfusion reaction出現時 全開で投与													
治療	抗がん剤処方	般)アセトアミノフェン錠200mg 3 錠 頓服 プレメディ投与と同時に内服 1 回分 @ERd療法																											
		レブラミドカプセル5mg 5 cap 内服1回 就寝前 21 日分 Lenalidomide p.o. day1-21@ERd療法 必)腎機能に応じて用量調節																											
									レナデックス錠4mg 10 錠 内服1回 朝食後 1 日分 DEXA 50mg/b day8@ERd療法																			
																般)アセトアミノフェン錠200mg 3 錠 頓服 プレメディ投与と同時に内服 1 回分 @ERd療法														
																							レナデックス錠4mg 10 錠 内服1回 朝食後 1 日分 DEXA 50mg/b day8@ERd療法						