**レジメン名** Kd56(週2回) #2～ q4w
**コメント** **MM**
**標準適用日数** 28日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 | 15病日 | 16病日 | 17病日 | 18病日 | 19病日 | 20病日 | 21病日 | 22病日 | 23病日 | 24病日 | 25病日 | 26病日 | 27病日 | 28病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【滴下順：1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント ルート確保用 確保済みの場合はskip可能 | 【滴下順：1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント ルート確保用 確保済みの場合はskip可能 | | | | | | 【滴下順：1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント ルート確保用 確保済みの場合はskip可能 | 【滴下順：1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント ルート確保用 確保済みの場合はskip可能 | | | | | | 【滴下順：1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント ルート確保用 確保済みの場合はskip可能 | 【滴下順：1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント ルート確保用 確保済みの場合はskip可能 | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順：2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ★カイプロリス点滴静注 56 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管<br>薬品 注射用水100mL 1 瓶<br>ブドウ糖注　5%　100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間30分<br>注射フリーコメント Carfilzomib 56mg/㎡ ＠#2～ Kd | 【滴下順：2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ★カイプロリス点滴静注 56 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管<br>薬品 注射用水100mL 1 瓶<br>ブドウ糖注　5%　100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間30分<br>注射フリーコメント Carfilzomib 56mg/㎡ ＠#2～ Kd | | | | | | 【滴下順：2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ★カイプロリス点滴静注 56 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管<br>薬品 注射用水100mL 1 瓶<br>ブドウ糖注　5%　100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間30分<br>注射フリーコメント Carfilzomib 56mg/㎡ ＠#2～ Kd | 【滴下順：2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ★カイプロリス点滴静注 56 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管<br>薬品 注射用水100mL 1 瓶<br>ブドウ糖注　5%　100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間30分<br>注射フリーコメント Carfilzomib 56mg/㎡ ＠#2～ Kd | | | | | | 【滴下順：2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ★カイプロリス点滴静注 56 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管<br>薬品 注射用水100mL 1 瓶<br>ブドウ糖注　5%　100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間30分<br>注射フリーコメント Carfilzomib 56mg/㎡ ＠#2～ Kd | 【滴下順：2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ★カイプロリス点滴静注 56 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管<br>薬品 注射用水100mL 1 瓶<br>ブドウ糖注　5%　100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間30分<br>注射フリーコメント Carfilzomib 56mg/㎡ ＠#2～ Kd | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順：3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | 【滴下順：3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | | | | | | 【滴下順：3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | 【滴下順：3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | | | | | | 【滴下順：3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | 【滴下順：3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス用 | | | | | | | | | | |
| 治療 | 抗がん剤処方 | レナデックス錠4mg 5 錠<br>内服1回　朝食後 2 日分<br>カイプロリス投与前に内服<br>DEXA 20mg/body day1,2＠#2～ Kd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | レナデックス錠4mg 5 錠<br>内服1回　朝食後 2 日分<br>カイプロリス投与前に内服<br>DEXA 20mg/body day8,9＠#2～ Kd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | レナデックス錠4mg 5 錠<br>内服1回　朝食後 2 日分<br>カイプロリス投与前に内服<br>DEXA 20mg/body day15,16##2～ Kd | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | レナデックス錠4mg 5 錠<br>内服1回　朝食後 2 日分<br>カイプロリス投与前に内服<br>DEXA 20mg/body day22,23#2～ Kd | | | | | | | | |