レジメン名 Kd70(週1回) #10～ q4w
コメント **MM**
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント ルート確保用 確保済みの場合はskip可能							【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント ルート確保用 確保済みの場合はskip可能							【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント ルート確保用 確保済みの場合はskip可能													
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カイプロリス点滴静注 70 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管 薬品 注射用水100mL 1 瓶 ブドウ糖注　5%　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント Carfilzomib 70mg/㎡ @#2～ Kd70(週1回)							【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カイプロリス点滴静注 70 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管 薬品 注射用水100mL 1 瓶 ブドウ糖注　5%　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント Carfilzomib 70mg/㎡ @#2～ Kd70(週1回)							【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カイプロリス点滴静注 70 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管 薬品 注射用水100mL 1 瓶 ブドウ糖注　5%　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント Carfilzomib 70mg/㎡ @#2～ Kd70(週1回)													
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用							【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用							【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス用													
治療	抗がん剤処方	レナデックス錠4mg 10 錠 内服1回　朝食後 1 日分 カイプロリス投与前に内服 DEXA 40mg/body day1@#2～ Kd70(週1回)																											
									レナデックス錠4mg 10 錠 内服1回　朝食後 1 日分 カイプロリス投与前に内服 DEXA 40mg/body day8@#2～ Kd70(週1回)																			
																レナデックス錠4mg 10 錠 内服1回　朝食後 1 日分 カイプロリス投与前に内服 DEXA 40mg/body day15@#2～ Kd70(週1回)														