レジメン名 PVd q3w (#1～8)
コメント **MM**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　 20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL Bor 1.3mg/㎡@PVd療法 ※溶解液の生食は計算せずに1AままでOKです			【滴下順:1】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　 20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL Bor 1.3mg/㎡@PVd療法 ※溶解液の生食は計算せずに1AままでOKです				【滴下順:1】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　 20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL Bor 1.3mg/㎡@PVd療法 ※溶解液の生食は計算せずに1AままでOKです			【滴下順:1】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　 20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL Bor 1.3mg/㎡@PVd療法 ※溶解液の生食は計算せずに1AままでOKです										
治療	抗がん剤処方	ポマリストカプセル4mg 1 cap 内服1回　就寝前 14 日分 Pom day1-14 p.o.@PVd 必要に応じてPomの調整をお願いします。																				
		レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 2 日分 DEXA 20mg/body day1,2@PVd ※75歳以上または必要に応じて減量を考慮して下さい。																				
					レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 2 日分 DEXA 20mg/body day4,5@PVd ※75歳以上または必要に応じて減量を考慮して下さい。																
									レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 2 日分 DEXA 20mg/body day8,9@PVd ※75歳以上または必要に応じて減量を考慮して下さい。											
												レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 2 日分 DEXA 20mg/body day11,12@PVd ※75歳以上または必要に応じて減量を考慮して下さい。											