レジメン名 RVD Lite q5w (DEXA 4days Ver.)
コメント **MM**
標準適用日数 35日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日	29病日	30病日	31病日	32病日	33病日	34病日	35病日
休薬完了	休薬完了																																			休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL Bor 1.3mg/㎡@RVD Lite ※溶解液の生食は計算せずに1Aままでオクです							【滴下順:1】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL Bor 1.3mg/㎡@RVD Lite ※溶解液の生食は計算せずに1Aままでオクです							【滴下順:1】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL Bor 1.3mg/㎡@RVD Lite ※溶解液の生食は計算せずに1Aままでオクです							【滴下順:1】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 溶解濃度:2.5mg/mL Bor 1.3mg/㎡@RVD Lite ※溶解液の生食は計算せずに1Aままでオクです													
治療	抗がん剤処方	レブラミドカプセル5mg 3 cap 内服1回　就寝前 21 日分 LEN day1-21 p.o.@RVD Lite 腎機能の応じてLENの調整をお願いします。																																		
		レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 1 日分 DEXA 20mg/body day1@RVD Lite																																		
									レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 1 日分 DEXA 20mg/body day8@RVD Lite																										
																レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 1 日分 DEXA 20mg/body day15@RVD Lite																				
																							レナデックス錠4mg 5 錠 内服1回　朝食後 1 日分 DEXA 20mg/body day22@RVD Lite														