レジメン名 #1 VMP q6w
コメント **MM**
標準適用日数 42日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 | 15病日 | 16病日 | 17病日 | 18病日 | 19病日 | 20病日 | 21病日 | 22病日 | 23病日 | 24病日 | 25病日 | 26病日 | 27病日 | 28病日 | 29病日 | 30病日 | 31病日 | 32病日 | 33病日 | 34病日 | 35病日 | 36病日 | 37病日 | 38病日 | 39病日 | 40病日 | 41病日 | 42病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【滴下順:0】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP<br>溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解) | | | 【滴下順:0】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP<br>溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解) | | | | 【滴下順:0】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP<br>溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解) | | | 【滴下順:0】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP<br>溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解) | | | | | | | | | | | | 【滴下順:0】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP<br>溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解) | | | 【滴下順:0】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP<br>溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解) | | | | 【滴下順:0】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP<br>溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解) | | | 【滴下順:0】<br>手技 皮下注射<br>薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 本<br>用法 1日1回<br>注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP<br>溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解) | | | | | | | | | | |
| 治療 | 抗がん剤処方 | アルケラン錠2mg 9mg/㎡<br>内服1回　朝食前 4 日分<br>L-PAM 9mg/㎡ day1-4@VMP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | プレドニン錠【5mg】60mg/㎡<br>内服1回　朝食後 4 日分<br>PSL 60mg/㎡ day1-4@VMP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |