レジメン名 #2～9 VMP q5w
コメント **MM**
標準適用日数 35日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日	29病日	30病日	31病日	32病日	33病日	34病日	35病日
休薬完了	休薬完了																																			休薬完了
当日確認	当日実施確認																																			
注射	抗がん剤注射	注射指示コメント【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)							注射指示コメント【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)							注射指示コメント【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)							注射指示コメント【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液　20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@VMP 溶解濃度 Bor2.5mg/mL(生食1.2mLで溶解)													
治療	抗がん剤処方	アルケラン錠2mg 4.5 錠/㎡ 内服1回　朝食前 4 日分 L-PAM 9mg/㎡ day1-4@VMP																																		
		プレドニン錠【5mg】12 錠/㎡ 内服2回　朝・昼食後 4 日分 状況に合わせて不均等投与お願いします PSL 60mg/㎡ day1-4@VMP																																		