レジメン名 Pembrolizumab 200 q3w
コメント MSI-Highを有する固形癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤	【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント ライン確保用																				
		【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 キイトルーダ点滴静注(25mg/mL) 200 mg 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 116 ml/h 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント Pembrolizumab 200mg/body 全量 58mL フィルタ付ルートを使用																				
		【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス																				