レジメン名 Pembrolizumab 400 q6w
コメント MSI-Highを有する固形癌
標準適用日数 42日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日	29病日	30病日	31病日	32病日	33病日	34病日	35病日	36病日	37病日	38病日	39病日	40病日	41病日	42病日
休薬完了	休薬完了																																									休薬完了
注射	抗がん剤	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント ライン確保用																																								
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 キイトルーダ点滴静注(25mg/mL) 400 mg 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 132 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント Pembrolizumab 400mg/body 全量 66mL フィルタ付ルートを使用																																								
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																																								