レジメン名 Bendamstine90 q4w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 27日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日
休薬完了	休薬完了																											休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 208 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント トレアキシンの投与15分前に開始	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｷｻﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 208 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント トレアキシンの投与15分前に開始																								
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 トレアキシン注 90 mg/㎡ 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント BR療法 Benda 90mg/㎡ day1,2 調製後3時間以内に投与を完了する	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 トレアキシン注 90 mg/㎡ 注射用水100mL 1 瓶 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント BR療法 Benda 90mg/㎡ day1,2 調製後3時間以内に投与を完了する																								
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス																								