レジメン名 CVEP(CPA750+VCR1.4+VP16 200内服＋PSL100) q3w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
		【滴下順:2】 手技 ワンショット静脈注射 薬品 オンコビン注(VCR) 1.4 mg/㎡ 生理食塩液　20mL 1 A 用法 1日1回 注射フリーコメント VCR 1.4mg/㎡ 上限2mg/body@CVEP 生食はVCRの量に合わせて0.1mg/mLで調製 投与前日よりイトリゾールを3日間休薬																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エンドキサン注(CPA) 750 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント CPA 750mg/㎡@CVEP療法																				
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
治療	抗がん剤処方	ペプシドカプセル25mg 8 cap 内服2回 朝・夕食後 5 日分 VP16 200mg/body p.o. day1-5@CVEP(ETP内服)																				
		プレドニン錠【5mg】20 錠 10 -6 -4 -0 -0 -0 で投与 内服3回 朝・昼・夕食後 5 日分 PSL 100mg/body p.o. day1-5@CVEP(ETP内服)																				
		般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間 1 日分																				
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																			