レジメン名 DA-EPOCH 1段階増量用 q3w
コメント **赤ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 20日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日
休薬完了	休薬完了																				休薬完了
注射	抗がん剤注射	【点下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																		
			【点下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【点下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【点下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【点下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分														
		【点下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR･ADR) 12 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DA-EPOCH 1段階上昇 VP16,DOX 20%増量 DOX 12mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 60mg/㎡ VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する フィルタをつけずに接続する。	【点下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR･ADR) 12 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DA-EPOCH 1段階上昇 VP16,DOX 20%増量 DOX 12mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 60mg/㎡ VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する フィルタをつけずに接続する。	【点下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR･ADR) 12 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DA-EPOCH 1段階上昇 VP16,DOX 20%増量 DOX 12mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 60mg/㎡ VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する フィルタをつけずに接続する。	【点下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR･ADR) 12 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DA-EPOCH 1段階上昇 VP16,DOX 20%増量 DOX 12mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 60mg/㎡ VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する フィルタをつけずに接続する。														
						【点下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エンドキサン注(CPA) 900 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント DA-EPOCH 1段階上昇用 CPA 900mg/㎡														
						【点下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス														
治療	抗がん剤処方	プレドニン錠【5mg】 80mg/㎡ 内服3回 朝･昼･夕食後 5 日分 用量に応じて不均等投与をお願いします DA-EPOCH療法 1段階増量																			
		般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																			
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																		