レジメン名 DA-EPOCH 2段階増量用 q3w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 20日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日
休薬完了	休薬完了																				休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																			
			【適下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【適下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【適下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【適下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分														
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR・ADR) 14 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 70 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DA-EPOCH 2段階上昇 VP16,DOX 40%増量 DOX14mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 70mg/㎡ VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR・ADR) 14 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 70 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DA-EPOCH 2段階上昇 VP16,DOX 40%増量 DOX14mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 70mg/㎡ VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR・ADR) 14 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 70 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DA-EPOCH 2段階上昇 VP16,DOX 40%増量 DOX14mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 70mg/㎡ VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR・ADR) 14 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 70 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DA-EPOCH 2段階上昇 VP16,DOX 40%増量 DOX14mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 70mg/㎡ VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する														
						【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エンドキサン注(CPA) 1050 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント DA-EPOCH 2段階上昇用 CPA 1050mg/㎡													
						【適下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス													
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																			
		プレドニン錠【5mg】60mg/㎡ 内服3回 朝・昼・夕食後 5 日分 用量に応じて不均等投与をお願いします DA-EPOCH療法 2段階増量																			
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																		