レジメン名 DeVIC q3w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 240 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント DEXA 40mg/b@DeVIC																				
			【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 440 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント DEXA 40mg/b@DeVIC	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 440 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント DEXA 40mg/b@DeVIC																	
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント DEHPフリーのルートを使用 VP-16 100mg/㎡@DeVIC	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント DEHPフリーのルートを使用 VP-16 100mg/㎡@DeVIC	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント DEHPフリーのルートを使用 VP-16 100mg/㎡@DeVIC																	
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) 300 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント CBDCA 300mg/㎡@DeVIC																				
		【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント イホマイド開始1時間前から mesna 300mg/㎡①@DeVIC	【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント イホマイド開始1時間前から mesna 300mg/㎡①@DeVIC	【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント イホマイド開始1時間前から mesna 300mg/㎡①@DeVIC																	
		【適下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イホマイド注(IFM) 1.5 g/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント IFM 1.5g/㎡@DeVIC	【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イホマイド注(IFM) 1.5 g/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント IFM 1.5g/㎡@DeVIC	【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イホマイド注(IFM) 1.5 g/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント IFM 1.5g/㎡@DeVIC																	
		【適下順:6】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【適下順:5】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【適下順:5】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																	
		【適下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後4時間後 mesna 300mg/㎡②@DeVIC	【適下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後4時間後 mesna 300mg/㎡②@DeVIC	【適下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後4時間後 mesna 300mg/㎡②@DeVIC																	
		【適下順:8】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後8時間後 mesna 300mg/㎡③@DeVIC	【適下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後8時間後 mesna 300mg/㎡③@DeVIC	【適下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後8時間後 mesna 300mg/㎡③@DeVIC																	
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																				
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																			