レジメン名 2/3 DeVIC q3w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
当日確認	当日実施確認																					
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 240 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント DEXA 40mg/b@DeVIC																				
			【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 440 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント DEXA 40mg/b@DeVIC	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 440 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント DEXA 40mg/b@DeVIC																			
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 67 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント DEHPフリーのルートを使用 VP-16 67mg/㎡@ 2/3 DeVIC	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 67 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント DEHPフリーのルートを使用 VP-16 67mg/㎡@ 2/3 DeVIC	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 67 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント DEHPフリーのルートを使用 VP-16 67mg/㎡@ 2/3 DeVIC																		
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) 200 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント CBDCA 200mg/㎡@ 2/3 DeVIC																				
		【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント イホマイド開始1時間 mesna 200mg/㎡①@ 2/3 DeVIC	【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント イホマイド開始1時間 mesna 200mg/㎡①@ 2/3 DeVIC	【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント イホマイド開始1時間 mesna 200mg/㎡①@ 2/3 DeVIC																		
		【適下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イホマイド注(IFM) 1 g/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント IFM 1.0g/㎡@ 2/3 DeVIC	【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イホマイド注(IFM) 1 g/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント IFM 1.0g/㎡@ 2/3 DeVIC	【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イホマイド注(IFM) 1 g/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント IFM 1.0g/㎡@ 2/3 DeVIC																		
		【適下順:6】 持続点滴末梢側管① 生理食塩液 50mL	【適下順:5】 持続点滴末梢側管① 生理食塩液 50mL	【適下順:5】 持続点滴末梢側管① 生理食塩液 50mL																		
		【適下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後4時間後 mesna 200mg/㎡②@ 2/3 DeVIC	【適下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後4時間後 mesna 200mg/㎡②@ 2/3 DeVIC	【適下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後4時間後 mesna 200mg/㎡②@ 2/3 DeVIC																		
		【適下順:8】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後8時間後 mesna 200mg/㎡③@ 2/3 DeVIC	【適下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後8時間後 mesna 200mg/㎡③@ 2/3 DeVIC	【適下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ウロミテキサン注 200 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後8時間後 mesna 200mg/㎡③@ 2/3 DeVIC																		
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																				
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																			