レジメン名 ESHAC q3w(CBDCA)
コメント **NHL**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント【点滴時間は状況に合わせて調製する】 【メイン1番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント【点滴時間は状況に合わせて調製する】 【メイン1番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント【点滴時間は状況に合わせて調製する】 【メイン1番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント【点滴時間は状況に合わせて調製する】 【メイン1番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント【点滴時間は状況に合わせて調製する】 【メイン1番目】													
		【滴下順:0】 手技 中心静脈ポンプ(精密) 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:1.5 ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント CBDCA 目標AUC 5 の1/4を1日量とする ★★5/4＝1.25だがAUCは1.5で設定されています★★ 【別ルートで24hr】	【滴下順:0】 手技 中心静脈ポンプ(精密) 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:1.5 ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント CBDCA 目標AUC 5 の1/4を1日量とする ★★5/4＝1.25だがAUCは1.5で設定されています★★ 【別ルートで24hr】	【滴下順:0】 手技 中心静脈ポンプ(精密) 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:1.5 ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント CBDCA 目標AUC 5 の1/4を1日量とする ★★5/4＝1.25だがAUCは1.5で設定されています★★ 【別ルートで24hr】	【滴下順:0】 手技 中心静脈ポンプ(精密) 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:1.5 ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント CBDCA 目標AUC 5 の1/4を1日量とする ★★5/4＝1.25だがAUCは1.5で設定されています★★ 【別ルートで24hr】													
		【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【投与順側管1番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【投与順側管1番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【投与順側管1番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【投与順側管1番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【投与順側管1番目 メインの側管より投与する】													
		【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 ソル・メドロール静注用500mg(メチルプレドニゾロン) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mPSL 500mg/body@ESHAC 【投与順側管2番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 ソル・メドロール静注用500mg(メチルプレドニゾロン) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mPSL 500mg/body@ESHAC 【投与順側管2番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 ソル・メドロール静注用500mg(メチルプレドニゾロン) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mPSL 500mg/body@ESHAC 【投与順側管2番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 ソル・メドロール静注用500mg(メチルプレドニゾロン) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mPSL 500mg/body@ESHAC 【投与順側管2番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 ソル・メドロール静注用500mg(メチルプレドニゾロン) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mPSL 500mg/body@ESHAC 【投与順側管2番目 メインの側管より投与する】													
		【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 40 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 40mg/㎡@ESHAC療法 DEHPフリーのルートで投与する 【投与順側管3番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 40 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 40mg/㎡@ESHAC療法 DEHPフリーのルートで投与する 【投与順側管3番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 40 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 40mg/㎡@ESHAC療法 DEHPフリーのルートで投与する 【投与順側管3番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 40 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 40mg/㎡@ESHAC療法 DEHPフリーのルートで投与する 【投与順側管3番目 メインの側管より投与する】													
						【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント AraC 2000mg/㎡@ESHAC療法 予め100mL抜いてから調製 【投与順側管3番目 メインの側管より投与する】													
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント DAy1-4はETP後、day5はAraC後リンス	【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント DAy1-4はETP後、day5はAraC後リンス	【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント DAy1-4はETP後、day5はAraC後リンス	【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント DAy1-4はETP後、day5はAraC後リンス													
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【投与順側管4番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【投与順側管4番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【投与順側管4番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【投与順側管4番目 メインの側管より投与する】	【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【投与順側管4番目 メインの側管より投与する】													
		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 41.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間12時間 注射フリーコメント 点滴時間は状況に合わせて調製する 【メイン2番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 41.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間12時間 注射フリーコメント 点滴時間は状況に合わせて調製する 【メイン2番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 41.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間12時間 注射フリーコメント 点滴時間は状況に合わせて調製する 【メイン2番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 41.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間12時間 注射フリーコメント 点滴時間は状況に合わせて調製する 【メイン2番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 41.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間12時間 注射フリーコメント 点滴時間は状況に合わせて調製する 【メイン2番目】													
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																			
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																		
					フルメトロン点眼液0．1%5mL 1 本 点眼 1日4回両目に点眼 キロサイド投与前日～終了翌日まで点眼																