レジメン名 ESHAP q3w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 ▼硫酸Mg補正液（1mEq/mL）20mL 8 ml 用法 1日1回 注射フリーコメント 初日だけはCDDP前に投与を終わらせる 【メイン1番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 ▼硫酸Mg補正液（1mEq/mL）20mL 8 ml 用法 1日1回 注射フリーコメント 初日だけはCDDP前に投与を終わらせる 【メイン1番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 ▼硫酸Mg補正液（1mEq/mL）20mL 8 ml 用法 1日1回 注射フリーコメント 初日だけはCDDP前に投与を終わらせる 【メイン1番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 ▼硫酸Mg補正液（1mEq/mL）20mL 8 ml 用法 1日1回 注射フリーコメント 初日だけはCDDP前に投与を終わらせる 【メイン1番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 ▼硫酸Mg補正液（1mEq/mL）20mL 8 ml 用法 1日1回 注射フリーコメント 初日だけはCDDP前に投与を終わらせる 【メイン1番目】													
		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 初日だけはCDDP前に投与を終わらせる 【メイン2番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 初日だけはCDDP前に投与を終わらせる 【メイン2番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 初日だけはCDDP前に投与を終わらせる 【メイン2番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 初日だけはCDDP前に投与を終わらせる 【メイン2番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント 初日だけはCDDP前に投与を終わらせる 【メイン2番目】													
		【滴下順:1】 手技 持続中心静脈側管① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント【投与順側管1番目 メインの側管より投与する】																			
		【滴下順:0】 手技 中心静脈ポンプ(精密) 薬品 シスプラチン注(CDDP) 25 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント CDDP 25mg/㎡@ESHAP 【遮光カバー必要】 【別ルートで24hrかけて投与】	【滴下順:0】 手技 中心静脈ポンプ(精密) 薬品 シスプラチン注(CDDP) 25 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント CDDP 25mg/㎡@ESHAP 【遮光カバー必要】 【別ルートで24hrかけて投与】	【滴下順:0】 手技 中心静脈ポンプ(精密) 薬品 シスプラチン注(CDDP) 25 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント CDDP 25mg/㎡@ESHAP 【遮光カバー必要】 【別ルートで24hrかけて投与】	【滴下順:0】 手技 中心静脈ポンプ(精密) 薬品 シスプラチン注(CDDP) 25 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間24時間 注射フリーコメント CDDP 25mg/㎡@ESHAP 【遮光カバー必要】 【別ルートで24hrかけて投与】													
		【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 ソル・メドロール静注用500mg(ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント【投与順側管2番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降は側管1番目】	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 ソル・メドロール静注用500mg(ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント【投与順側管2番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降は側管1番目】	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 ソル・メドロール静注用500mg(ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント【投与順側管2番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降は側管1番目】	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 ソル・メドロール静注用500mg(ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント【投与順側管2番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降は側管1番目】	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 ソル・メドロール静注用500mg(ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント【投与順側管2番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降は側管1番目】													
		【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 40 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 40mg/㎡@ESHAP療法 【投与順側管3番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管2番目】 DEHPフリーのルートで投与する	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 40 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 40mg/㎡@ESHAP療法 【投与順側管3番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管2番目】 DEHPフリーのルートで投与する	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 40 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 40mg/㎡@ESHAP療法 【投与順側管3番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管2番目】 DEHPフリーのルートで投与する	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 40 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント VP16 40mg/㎡@ESHAP療法 【投与順側管3番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管2番目】 DEHPフリーのルートで投与する													
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント ETP後リンス 【投与順側管4番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管3番目】	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント ETP後リンス 【投与順側管4番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管3番目】	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント ETP後リンス 【投与順側管4番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管3番目】	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢側管① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント ETP後リンス 【投与順側管4番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管3番目】													
		【滴下順:5】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 マンニットール注射液「YD」20%300mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント フィルタ付のルートを使用 【投与順側管5番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管4番目】	【滴下順:4】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 マンニットール注射液「YD」20%300mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント フィルタ付のルートを使用 【投与順側管5番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管4番目】	【滴下順:4】 手技 点滴中心静脈側管③ 薬品 マンニットール注射液「YD」20%300mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント フィルタ付のルートを使用 【投与順側管5番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管4番目】	【滴下順:4】 手技 点滴中心静脈側管① 薬品 マンニットール注射液「YD」20%300mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント フィルタ付のルートを使用 【投与順側管5番目 メインの側管より投与する】 【2日目以降側管4番目】													
						【滴下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント AraC 2000mg/㎡@ESHAP 予め100mL抜いてから調製する 【投与順側管2番目 メインの側管より投与する】													
						【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント AcaC後リンス													
		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント【メイン3番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント【メイン3番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント【メイン3番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント【メイン3番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント【メイン3番目】													
		【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント【メイン4番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント【メイン4番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント【メイン4番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント【メイン4番目】	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント【メイン4番目】													
治療	抗がん剤処方	錠）アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																		
			錠）アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																	
					フルメトロン点眼液0．1%5mL 1 本 点眼 1日4回両目に点眼 キロサイド投与前日～終了翌日まで点眼															