レジメン名 EPOCH q3w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 20日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日
休薬完了	休薬完了																				休薬完了
当日確認	当日実施確認																				
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																		
			【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分														
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR･ADR) 10 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 50 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DOX 10mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 50mg/㎡ EPOCH療法増減無し VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR･ADR) 10 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 50 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DOX 10mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 50mg/㎡ EPOCH療法増減無し VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR･ADR) 10 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 50 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DOX 10mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 50mg/㎡ EPOCH療法増減無し VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR･ADR) 10 mg/㎡ オンコビン注(VCR) 0.4 mg/㎡ エトポシド注(VP-16) 50 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント DOX 10mg/㎡,VCR 0.4mg/㎡,VP16 50mg/㎡ EPOCH療法増減無し VCR投与前日よりイトリゾールを3日間休薬 DEHPフリーのルートで投与する															
						【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エンドキサン注(CPA) 750 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント CPA 750mg/㎡@EPOCH療法														
						【滴下順:3】 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL														
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																		
		プレドニン錠【5mg】60mg/㎡ 内服3回 朝･昼･夕食後 5 日分 用量に応じて不均等投与をお願いします																		
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																	